

## 院内登録レジメン 胆道・膵臓

	レジメン名	抗がん剤名(一般名)	用法用量	1クール
1	GEM	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	28日
2	GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	28日
		パクリタキセル(アルブミン結合型)	点滴静注 125mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	
3	GEM+CDDP	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/m <sup>2</sup> day1,day8	21日
		シスプラチン	点滴静注 25mg/m <sup>2</sup> day1,day8	
4	FOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m <sup>2</sup> day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 180mg/m <sup>2</sup> day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m <sup>2</sup> day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m <sup>2</sup> day1	
5	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m <sup>2</sup> day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m <sup>2</sup> day1	
6	S-1+GEM①	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/m <sup>2</sup> day8,day15	21日
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	
7	S-1+GEM②	ゲムシタビン	点滴静注 1,000mg/m <sup>2</sup> day1,day8	21日
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 60~100mg/body/日 分2朝夕食後 day1~day14	
8	ペムプロリズマブ	ペムプロリズマブ	点滴静注 200mg/body day1	21日
9	オニバイド+5-FU/LV	オニバイド <sup>®</sup>	点滴静注 70mg/m <sup>2</sup> day1	14日
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m <sup>2</sup> day1	