

院内登録レジメン 大腸

	レジメン名	抗がん剤名(一般名)	用法用量	1クール
1	mFOLFOX6	オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	14日
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
2	Bmab+mFOLFOX6	ベバシズマブ	点滴静注 5mg/kg day1	14日
		オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
3	Cmab+mFOLFOX6	セツキシマブ	点滴静注 初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ² day1,day8	14日
		オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
4	Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	点滴静注 6mg/kg day1	14日
		オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
5	FOLFIRI	イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	14日
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
6	Bmab+FOLFIRI	ベバシズマブ	点滴静注 5mg/kg day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
7	Cmab+FOLFIRI	セツキシマブ	点滴静注 初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ² day1,day8	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
8	Pmab+FOLFIRI	パニツムマブ	点滴静注 6mg/kg day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	

院内登録レジメン 大腸

9	Rmab+FOLFIRI	ラムシルマブ	点滴静注 8mg/kg day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
10	ザルトラップ+FOLFIRI	アフリベルセプト ベータ	点滴静注 4mg/kg day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
11	XELOX	オキサリプラチン	点滴静注 130mg/m ² day1	21日
		カペシタビン	経口投与 2,000mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
12	Bmab+XELOX	ベバシズマブ	点滴静注 7.5mg/kg day1	21日
		オキサリプラチン	点滴静注 130mg/m ² day1	
		カペシタビン	経口投与 2,000mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
13	Bmab+Cape	ベバシズマブ	点滴静注 7.5mg/kg day1	21日
		カペシタビン	経口投与 2,000mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
14	Bmab+SOX	ベバシズマブ	点滴静注 7.5mg/kg day1	21日
		オキサリプラチン	点滴静注 130mg/m ² day1	
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
15	IRIS(4週法)	イリノテカン	点滴静注 125mg/m ² day1,day15	28日
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
16	Bmab+IRIS(4週法)	ベバシズマブ	点滴静注 5mg/kg day1	28日
		イリノテカン	点滴静注 125mg/m ² day1,day15	
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
17	IRIS(3週法)	イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	21日
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
18	Bmab+IRIS(3週法)	ベバシズマブ	点滴静注 7.5mg/kg day1	21日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day14	
19	Cmab単独	セツキシマブ	点滴静注 初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ² day1	7日
20	Cmab+CPT-11	セツキシマブ	点滴静注 初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ² day1,day8	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	

院内登録レジメン 大腸

21	Pmab単独	パニツムマブ	点滴静注 6mg/kg day1	14日
22	Pmab+CPT-11	パニツムマブ	点滴静注 6mg/kg day1	14日
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
23	Bmab+TAS-102	ベバシズマブ	点滴静注 5mg/kg day1,day15	28日
		TAS-102(トリフルリジン・チピラシル)	経口投与 70mg/m ² /日 分2朝夕食後 day1~day5,day8~day12	
24	Bmab+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ	点滴静注 5mg/kg day1	14日
		オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	
		イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	
		5-FU(持続)	点滴静注 2,400mg/m ² day1	
25	FOLFOX4	オキサリプラチン	点滴静注 85mg/m ² day1	14日
		5-FU(急速)	点滴静注 400mg/m ² day1,day2	
		5-FU(持続)	点滴静注 600mg/m ² day1,day2	
26	CPT-11	イリノテカン	点滴静注 150mg/m ² day1	14日
27	ニボルマブ	ニボルマブ	点滴静注 240mg/body day1	14日
28	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	点滴静注 200mg/body day1	21日